

ANEXO A3

– NÚMERO MÍNIMO DE INDIVÍDUOS (NMI) e NÚMERO MÁXIMO DE INDIVÍDUOS (NMáxI) –

MATUROS




Figura A3.1 Determinação do NMI maturos através da repetição óssea (segundo Herrman et al., 1990) e da ausência de antímeros [segundo Masset (1974), adaptado]. Esq, esquerdo; dto, direito; ant, antímero.




Figura A3.2 Determinação do NMáxI maturos (segundo Herrman et al., 1990). Esq, esquerdo; dto, direito.




Figura A3.3 Determinação do NMI maturos através da repetição óssea (segundo Herrman et al., 1990) e da ausência de antímeros [segundo Masset (1974), adaptado]. Esq, esquerdo; dto, direito; ant, antímero.




Figura A3.4 Determinação do NMI maturos através da repetição óssea (segundo Herrman et al., 1990) e da ausência de antímeros [segundo Masset (1974), adaptado]. MC, metacárpico; Esq, esquerdo; dto, direito; ant, antímero.




Figura A3.5 Determinação do NMI maturos através da repetição óssea (segundo Herrman et al., 1990) e da ausência de antímeros [segundo Masset (1974), adaptado]. Esq, esquerdo; dto, direito; ant, antímero.




Figura A3.6 Determinação do NMI maturos através da repetição óssea (segundo Herrman et al., 1990) e da ausência de antímeros [segundo Masset (1974), adaptado]. MT, metatársico; Esq, esquerdo; dto, direito; ant, antímero.




Figura A3.7 Determinação do NMI maturos através da repetição óssea (segundo Herrman et al., 1990) e da ausência de antímeros [segundo Masset (1974), adaptado]. Flg, falange; p, proximal; d, distal; esq, esquerdo; dto, direito; ant, antímero.




Figura A3.8 Determinação do NMI maturos através da repetição óssea (segundo Herrman et al., 1990) e da ausência de antímeros [segundo Masset (1974), adaptado]. C, cervical; imat, imaturos; mat, maturos.

IMATUROS




Figura A3.9 Determinação do NMI imaturos através da repetição óssea (segundo Herrman et al., 1990) e da ausência de antímeros [segundo Masset (1974), adaptado]. Ep, epífise; p, proximal; d, distal; esq, esquerdo; dto, direito; ant, antímero.




Figura A3.10 Determinação do NMI imaturos através da repetição óssea (segundo Herrman et al., 1990) e da ausência de antímeros [segundo Masset (1974) adaptado]. Ep, epífise; p, proximal; d, distal; esq, esquerdo; dto, direito; ant, antímero.




Figura A3.11 Determinação do NMI imaturos através da repetição óssea (segundo Herrman et al., 1990) e da ausência de antímeros [segundo Masset (1974), adaptado]. Esq, esquerdo; dto, direito; ant, antímero.




Figura A3.12 Determinação do NMáxI imaturos segundo Herrman et al. (1990). Esq, esquerdo; dto, direito.




Figura A3.13 Determinação do NMI através da soma dos indivíduos imaturos com os maturos (igual região anatômica). *, NMI determinado por repetição óssea; c, cervical; MC, metacárpico; MT, metatársico.

DENTES

Tabela A3.1
Dentição definitiva

Maxilar																
	Direita								Esquerda							
FDI	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
Soltos	20	40	34	25	39	54	36	47	53	37	46	43	22	37	39	24
Alvéolo	5	16	19	14	10	6	4	1	1	8	7	14	14	19	15	7
Total	25	56	53	39	49	60	40	48	54	45	53	57	36	56	54	31
Mandibular																
	Direita								Esquerda							
FDI	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Soltos	13	39	45	35	34	57	53	29	37	56	45	34	25	34	43	14
Alvéolo	10	25	28	20	21	10	10	11	9	12	16	13	16	26	20	15
Total	23	64	73	55	55	67	63	40	46	68	61	47	41	60	63	29

Tabela A3.2
Dentição decídua

Maxilar										
	Direito					Esquerdo				
FDI	55	54	53	52	51	61	62	63	64	65
Soltos	14	10	16	8	12	8	11	14	9	16
Alvéolo	3	4	1	1	0	0	0	0	4	3
Total	17	14	17	9	12	8	11	14	13	19
Mandibular										
	Direita					Esquerda				
FDI	85	84	83	82	81	71	72	73	74	75
Soltos	14	10	10	10	2	3	8	13	9	6
Alvéolo	6	8	0	0	0	0	0	0	7	8
Total	20	18	10	10	2	3	8	13	16	14